

**DE ACTIONE
IRRITATIVA
OBSERVATIONES
DISSERTATIO
INAUGURALIS...**

Liberalis Signoretti



DE
ACTIONE IRRITATIVA
OBSERVATIONES

Dissertatio Inauguralis

QUAM AD LAUREAM IN MEDICINA RITE CONSEQUENDAM
IN PRÆILLUSTRI ALCORNGYMNASIO PATAVINO OBTVLIT

LIBERALIS SIGNORETTI

VERETUS TARVISINUS



PATAVII

EX OFFICINA SOCIORUM TITOLO MINERVA

1834

Signoretto

ALLA
DOLETTESSIMA ED OTTIMA MADRE
IN SEGNO
D'AMORE E D'ANIMO GRATO
QUESTO TENUE LAVORO
CONSECRA
IL FIGLIO AFFEZIONATISSIMO

1

2

3

4

5

6

Vivendi potentia, quam vitalitatem nervelli vocitant, a vita promus discernenda est, nec quisquam recte dixerit, vivendi potentiam, vivendique actum, unum eundemque sensum exhibere. Non ne animas fallit; in tam implicata humani corporis conformations, ne puncto quidem temporis, quod quidem percipi possit, haec vivendi potentia a vita potest segregari. Verum in questionibus ad vitam pertinentibus duo omnino sunt attendenda: primum videlicet vitalitas, qua praedita sunt organa humani corporis machinam constituentia, deinde corpora quae in illam dum agunt, eidem motum induunt; siquidem nil aliud vita est, quam exterius corporum in vim vitalem actio, quemadmodum, licet nequaquam dilucide et evulcente, sapienter tamen ostendit Scetus ille Reformator, qui prior solidissimi fundamenta jecit, ubi asseruit, e stimolorum ad excitabilitatem applicatione vitam oriri. Qua ex re nihil rationi fuit magis consentaneum, quam ut omnes Physiologorum investigationes in eo vererentur, ut non modo vitalitatis leges definirent, verum etiam morus modosque varios deprehenderent, quibus exterius corpora in nos agunt, quibus rationis inter haec et nostra organa intercedat. Horum quoad primum, clarissimi Professoris Gallii physiologicae investigationes, nihil amplius optandum reliquerunt; alteri vero, cui morborum variis e causis magna lux oboriebatur, sese dedit non parvus illustrum Pathologorum numerus, qui tanti rei momenti in gravissimas questiones deduxerunt. Ac sane nil melius, nihil prestatilius, nihil sanctius esse poterat, longuocenti siquidem humanitati meliores explicatus praesto erant causae, quibus identidem salus in descri-

men vacatur; tutioresque hinc doctrinae, et magis philosophicae, ut his malis eximeretur, quorum frustra levamen interdum petitur ab ejusmodi arte, quae utiliter humano generi esse deberet, qualis fortasse decessu temporis, crescente in dies doctrinarum splendore futura est. Atque hic sapientissimi quique Pathologi, cum de exteriorum corporum in organa nostra actione, ejusdemque variis effectibus disceptarent, omnes pariter in hanc sententiam discesserunt, variis modis videlicet ipsa animalia texturas partes imprimis irritando scilicet, stimulando, et contrahendo. Quomodo vero quare de causa haec corpora aliud alio modo in nos agant, si nil tandem aliud ea possunt effluere, nisi ut elementorum nostri corporis partes constituentium mutam posituram, proportionemque commutent! Cur quaedam certis limitibus suam vim, actionemque circumscribant; quaedam vero toto corpore, eodem tempore, propagant atque disseminant? Haec mihi cum hodierna die investiganda susceperim, magna spe teneor fore ut materiae ipsae conditioque dicendi plurimis mei operis vitis indulgentiam precabuntur.

Corpora reperiri alio aliis modis vel contrariis in nos agentia, ex tot obruta, luculentisque factis eruitur, ut hac super re nullus ambigendi locus relinquitur. Ac sane hominem qui quorundam substantiarum usu suis organis tantum addidit vitalitatis, ut illas etiam impressiones sentiat, quae circa antea indifferens fuisset hominem ipsam nulla etiam evacuatione, aliis corporibus vim suam in illud exercocribus hoc vitalitatis augmentum amittit; nec id solum, sed etiam adeo infra naturalem ejus conditionem deprimi potest, ut insensibilis proinus evadat his ipsis agentibus quae in sanitate illud excitescent, idemque demum effectus subsequatur, qui a stimularum defectu oritur, quique a Brauno debilitas

directa vocabatur. Verum prius agentium classis humanum corpus, ab eo languere revocat, in quem a secunda detrusum fuerat. Sunt igitur substantiæ, quæ in nostra organa actiones exercent omnino contrariæ inter se; quæ quidem substantiæ contrastimulantium, aut hypostenizantium, et stimulantium aut hyperstenizantium nomine libuit appellare. Nec hactenus prorsus esset difficile perspicere quomodo quibusque de cænis hæc corpora alia aliter omnino humanam machinam modificantur. Inter alia vel plurima etiam hæc subponi posset, minime ab hyperstenizantibus augeri, minus autem ab hypostenizantibus in nostris organis vim principii illius, quod expendens vocatur. Quod quidem vel actio ostendere videtur, cur ab illis augeatur, minuanturque, ab his diversi vitalitatis gradus, diversi nostris corporis partibus inhaerentes. Sed in nostra organa exteriorum corporum actio nequaquam hæc finibus terminatur. Tertia igitur admittenda erit substantiarum classis, quæ illa prorsus aliter, ac duæ priores modificatur. In hyperstenica et hypostenica diathesi in vitalitatis augmento, aut diminutione, quæ quidem effectus hyperstenizantis aut hypostenizantis important, tertias loquace classis actio corporum, quæ Pathologi irritantia vocitarunt, nullam ullam mutationem inducunt; quia et ab eadem morbi utriusque generis tristissimi affectus promoverentur, augerenturque. Nec aliter actio deleteria irritantium, quæ per organorum, qui excitantur motus, partium integritatem evertit, actio, inquam, irritativa celerina membrorum, in quæ hyperstenizantis aut hypostenizantis agunt, dissolutionem inducit. Duæ alie agentis, hyperstenizantis videlicet et hypostenizantis, quam claudime toto corpore vim suam percipi vident, omnibusque ejus partibus effectus exhibent salutares, contraria diathesi dominante. Contra en irritantia in illam par-

tem tantum agunt, quam contingunt, aut ad summum in proximam, irritatiæque consentientes. Quod si propagatur irritatio, si quando efficit, ut prævalent diathesis, id tunc solummodo accidere dicendum est, cum irritatio alicujus membri magnam partem invasit, nec unquam id celeriter, ut duas alie agant modificationum classes, sed gradatim utique, et, ut ajunt, per irradiationem. Præterea hyperstenizantia et hypostenizantia, si in diversis corporis partibus operantur, sese invicem adjuvant, semperque ad augendam, minuéndamque vitæ intensitatem suas vires eodem conferunt, universæque eorum actio, ex singulis actionibus redundat, quæ in diversis partibus exercentur. Verum ab irritantibus multum abest, ut alterum alteri opem ferat; quin potius ita agunt, ut partis irritatio alterius partis irritativam conditionem luminum; ita ut medici quique doctrina præstantissimi magnum ex irritantibus salutis fontem eliciant, dum in partes, aut nil, aut non admodum vitæ necessarias, irritationem deducunt, liberant illa organa, quorum læsione ad exitum ægrotus ducitur. Tandem Bondiolus animadvertit, substantias reperiri, quæ irritativa facultate polleant; nec non hyperstenizanti et hypostenizanti. Quod si facta omnia tertiam hæc rationem nonnulla inter modificantia humanum corpus admittant, quomodo profecto ejus leges definiemus, modumve alterum, quo possit illa existere, poterimus intueri? Satis constat, irritantis in cutem, membranisque cuti contiguas agere, et in nervos hinc extremitates, quas per ipsas diffunduntur; satis constat impressiones ad cerebrum per nervos ferri, atque ab eo reflecti, nisi maxima sit irritatio, ad nonnulla motus organa, maximeque ad illas partes, quæ irritantia modificantur; satis tandem constat nervorum, vasorumque sanguineorum adhesionem, nec non lege de motus propagatione, quæ impressiones ad osstrum maximum perlatas illudque

molestia efficientes, per alios nervos transire debent, ut motus organa excitent, quae aut expansione, aut contractione corporis motum aut minuant, aut tollant, satis inquam constat, illos posternaturales cerebri impressiones a cerebro in partis irritatae capillaria vasa reflectas, illuc sine dubitatione ulla sanguinis concurreniam debere deducere. Sed si hyperstemicantia et hypostemicantia pariter tantum in extremum illud integumentum agerent, in membranasque illi adhaerentes, earum tam rapide eorum actio toto corpore diffunderetur, earum et irritationum actio affectuum partium finibus non circumscriberetur? Nec quinquam recte dixerit, quod fibras nervas acutas urgant, idcirco eorum actionem per omnia motus organa propagari. Hoc asserere frustra esset, dum prompto iidem hyperstemicantium et hypostemicantium actio diffunderetur, dumque haec ultima, quae modo periculi a primis diversa agunt, eadem celeritate immutationem operetur vitium, quibus omnia vivantis membra praedita sunt. Quod si impressiones, quae haec agentis in extremitates nervos exercant, haud quaquam satis modum explerent, quo celeriter vasorum, ceterumque interiorum vim parietibus inhaerentem efficiunt, admiendum sane est, eorum moleculas per absorptionem circumlatas, naturalem stimulandi vim sanguinis propriam aut augere, aut imminuere, sanguinem ipsum aut hyperstemicantem aut hypostemicantem efficere, ita ut solito majores, minoresve alteros motus exhibeat, et hinc porro argant, imminuative vim vitalem parietibus cavorum inhaerentem, quae vasculare systema constituent. Haec theoria non admodum difficulte intellectus videtur, dummodo quis notas animadvertat, et characteres, quibus vis irritativa ab hyperstemicanti et hypostemicanti acceruitur; haec theoria comprobari videtur omnium consensu medicorum, qui dum vitalitatem volent aut attollere, aut depr-

mere, aliquid substantiis aegrotis prescribere consueverunt, quas isti vel lociti glutine coguntur. Quod si horum agentium vis sensitum afferentium, in nervosa extremitates tantum agerent, cur profecto opus esset illa in stomachum immitti, cum integumentis potius externalis applicari posset, ubi fibræ nervosæ corporum impulsionem melius percipiunt? Quem autem præterit hypostenizantis et hypostenizantis a medicis prescripta, in cura sua dimittere, ubi lymphaticorum actio major est, a quibus ipsæ absorbentur et circumferuntur, ut fluidi sanguinei stimulantem vim aut augeant aut immittant, ac quia unquam dixerit opium aliique pharmaca, quæ in quadam quantitate in ventriculum immixta, tam cito exitiæ sunt, tam cito exitiæ pariter futura, si eundem cutis partem applicentur, ubi nempe extremitates nervosæ externalium virium actionibus magis sunt obtusæ? Præterea sic dicta irritantia, quorum in organo nostro actio in imprimendo præternaturali modo fibræ nervis excutitur, hæc inquam irritantia substantiæ sunt, aut parum aut nil omnino assimilabiles; easque medicus plerumque applicat alicujus cuti partis, in qua statendam arbitratur irritationem, quæ et oriri et augeri possit stertius damno irritationis aliquid aliud nobilius organum, vitæque magis necessarium occupant. Hinc minime inexplicabile credit phænomenon illud, jam tunc ab Hippocrate perpetuo medicorum experientia observatum, minus videlicet, aut prope totam irritationem minus partis, tunc cum in altera parte irritatio major aut per se oritur, aut data operi amittitur. Actiones hæc irritantium in partem, quam percellunt, a fibræ nervis ad centrum maximum transferuntur; sed inde lege, quæ de motus communicatione obtinet, de qua super mentionem fecimus, in partem ab irritantibus affectam remittuntur, hique motus moleculares inordinati concursu percipiunt fluidorum,

quæ magis magisque augetur irritatio, progrediturque interdum etiam tum cum ejus causa sublata est. Quod si quam aliam corporis partem vehementius causa quæpiam crebrina et fortius percellat, quam aliam, quæ in aliud agit organum, tunc illius impressio in cerebro prævalet, et si impressio composita, quæ ex conjunctione omnium illuc simul convenientium constat, ejusmodi non est, ut per omnia motus organa propagetur, transit necesse erit per fibras nervas ad partem vehementius irritatam pertinentes, cujus æconomia vitalis ideo perturbatur, et sanguinis concursu affligitur. Sic acies minori irritationis vi affectus hæc vacat organorum motibus, qui illi exitiales essent, quoniam impressiones, quibus ipse obnoxius est, omnes pariter ad partem transiunt, quæ crebrius fortiusque imprimitur, demptaque a primo, ab illo scilicet, qui minori irritationis vi agebatur, materiali causa, quæ illum eodem modo stimulabat, ad pristinum cito animum perducitur. Nec sane aliunde interdum evenire dicendum est, ut vescientis in fœtui hominis cutem ruborem exprimere nequiverint, et potuerit quiescentem tranquille ac se cruci affigere, quam quod impressiones istæ illis minores, quæ a cerebro irritate remittebantur in viscera, illud concorsum sanguinis augerent, morbumque ingravarent potius, quam organa moverent, quæ causam doloris electricæ minuerent, aut extinguerent. Numquid non his principis mirum in modum sensationem causæ explicari possunt, cum interdum cephalis, chrietibus aliisque ejusmodi, quæ ægritudine potius conficere possent viderentur, chronica aliqua irritatio sublata est? Non posset hæc medicus potiusquam stolidus ac supinus vulgi querelas disciplinarum nobilitatem criminantia, vel ipse admiratione sua adjuvaret, non posset, inquam, hic medicus salutiferas intemperantiae effectus alicui temporariae acceptas referre irritationis,

quae in aliquo organo constituta, illam quae jundis dominabatur extinguere potuisset. Hac admissa theoria, cum etiam satis constet, partes non solum pro vitalitate ipsas inhaerente, sed etiam pro stimulis, quibus ad motum excitantur, moveri, facilem res habet explicatum, cur in diathesi hyperstenica hypostenizantibus utendum sit, et viceversa, dum tunc aut imminuta vi sanguinis nimium stimulante, aut eadem aucta parum excitante, organa in naturalem vitalitatis gradum restituantur. Verum in conditione irritativa hyperstenizantium usus nequaquam utilis esset, nec hypostenizantium, quod in primo caso intensior sit impressionum reflexio a centro maximo ad artum irritantium actioni obnoxium, ex quo magis magisque crescit irritatio, aut facilius ab irritatione ad inflammationem res transit; quod quidem semper consequi necesse est, cum tot, et ejusmodi impressiones ab affectu morbo partibus ad centrum maximum perducuntur, ut necessario inde redeant ad omnes motus organa, hosque hinc ad vascorum parietes intermembrumque corvorum, quorum augeat vim, qua dilatantur, abstringunturque stimulo directe applicato. Hypostenizantium fortasse usus non tantum importabit detrimenti, nil tamen opis inde sperandum, dum in irritatione, quae ita proprio dicitur, vitalitas systematis vascularis parietibus inhaerens non turbata est, dumque talium usus substantiarum morbo morbum adderet. Idem in hyperstenica hypostenicasque diathesi non proderunt irritantia, quia nihil aliud agent, quam aut primas indirecte vim augebunt, aut alterius tribus effectus maturabunt, sanguinem videlicet concursum aliquo derivando, minuendaque illius fluidi copia, cuius massa vel tota haudquaquam per eam vitalitati in segroto fulciendas, amissionibusque reparandis, quibus subjacent corporis partes eam actionem exerceant. Atque hic consentaneum erit ob-

certare, quomodo fluida animalis superior, inferiorque normali gradu assimilata in duobus diversis diathesibus in retrogradas decompositionis assimilationibus possum in solitis locum facere secretionibus, quas ut causas irritantes in aliquod organum agerent; hic observari posset quomodo, cum sanguis plus minusve insolito semper modo sit assimilatus, fluida ipsa nutritiva plus minusve assimilanda sint, aliter quam in unitate opus esset, et hinc causa sit haec, cur in hypertensivantium et hypotensivantium actione potentia partium ad movendum aut augeatur, aut immineatur. Atque aliquid addendum esset de doctrina contagiorum, aut miasmatum, nisi quod a statutis principiis proficisceretur, me in ejusmodi rerum dimitteret perquisitionem, quam meae non arbitror facultatis. Ego hoc unum dicere ausim, debilitatem ab irritationibus inductam ab illa prorsus esse secernendam, quam hypotensivantis efficiunt; quoniam illa nihil aliud agunt, quam ut aliquo concursu dicant, eorumque excussionem curent, atque hinc massam minuunt universam, dum haec stimulantem sanguinis vim directe minuunt, totiusque hinc vitalitatis depressioni locum faciunt, cujus quidem generis depressio nunquam in irritata parte perspicitur, licet fluidi reparatoris defectu omnia alia organa languerent. Sed ex his principiis haud difficulter erui potest, hypertensivantis et hypotensivantis posse existere, quas irritandi facultate sint praedita substantiae priusquam absorbeantur, plus minusve in eorum membris illi continuae, atque hoc eo distans quo minus sunt assimilabiles. Subigitur illae quae se absorptae aliquantum difficiles exhibent, quaeque tandem aut totae aut partim absorbeantur, has substantias illae erant, quae facultate irritandi, nec non hypertensivandi et hypotensivandi gaudebunt. Verum ne multitudo nominum, quorum pro altero alterum facile posset usurpari, con-

fusionem inducat, hic sub finem jure merito illam arbitror nomenclaturam exhibendam, quam nonnulli nostrorum temporum praecleari Pathologi proposuerunt. Nimirum stimulantia vocarem illa corpora aut externa, aut introducta, perque interiora cura circumlata fluida, quae impressionem in partes vitalitate praeditas ejusmodi exercent, ut ad statum eas pristinum valeant adigere: dicerem autem irritantia illa corpora, quae cum minime assimilatione polleant, impressiones tantum insolitas et inordinatas membranis externis et cuti adfigunt. Hypertonicantium tandem et hypotonicantium nomine illa nuncuparem modificata, quarum elementa cum sint assimilabilia, a vasa lymphaticis absorbentur; sed ita stimulantis vim sanguinis augent aut imminuunt, ut hic solito plus minue vasorum parietes imprimens, non solum motus constrictis majores minoresve efficiat, sed vim quoque ejus viudem aut augent aut imminuat. Dixi.

THESES

I.

In operatione cataractae dilatatio pupillae arte prima promouenda.

II.

Inter medica laevanta vaccinatio principatum tenet.

III.

In lue syphilitica confirmata ex mercurialibus actione certa sublimatum magis pollet.

IV.

Mercurius, uti metallum purum, hominum organum vix afficit.

V.

Mulier syphilitica potest interdum contagium, quo afficitur, foeto suo communicare.

VI.

Medica peregrinatio quamplurimis foris videtur emolumentis.

VII.

Miliaria quaedam praefert odorem, qui summopere in diagnosi juvat.

VIII.

Venenum in cadavere repertum minime partum secum veneficium, etiam si venefici symptomata emineenter elicerent.

IX.

Nollus dubitat Rino-plasticam Indorum magnopere
Italicam praestare.

X.

Opium interdum repertum est validum febrifugum.

XI.

Balsamum Copaivae, primo blennorrhoeae stadio per-
fecto, propinari potest.

XII.

Balsamum Copaivae minime propinandum in Ble-
norrhoeis mulierum.

